

鎮咳祛痰劑  
<sup>®</sup>  
**滅咳康複合膠囊**  
<sup>®</sup>  
**MEDICON-A CAPSULES**

……成份與效用……

滅咳康複合膠囊係白色膠囊劑，每 1 膠囊所含成份如下表：

成 份	含 量	各 成 份 之 作 用
Dextromethorphan HBr	20mg	鎮咳
Potassium Cresolsulfonate	90mg	稀釋氣管之粘稠痰，使祛痰容易。
Lysozyme Chloride	20mg (力價)	分解粘稠痰，使祛痰容易。

……適 應 症……

鎮咳、祛痰。

……用法及用量……

成人（15 歲以上）1 次 1 膠囊，1 日服用 3 次。

本藥須由醫師處方使用

……使用滅咳康複合膠囊時，請注意下列各點……

1. 有下述情況者，服用前請與醫師或藥師商量。
  - (1) 本人或父母兄弟等有易引起蕁麻疹、斑疹、過敏性鼻炎、偏頭痛、食物過敏等體質者。
  - (2) 曾發生藥物過敏症狀（如發燒、發疹、關節痛、搔癢等）者。
  - (3) 有宿疾、體弱或發高燒者。
  - (4) 孕婦或疑似懷孕之婦人。

- (5)正接受醫師治療者。
- 2.服用之際，請注意下列各點：
- (1)本劑因含有相當於劇藥之成份，請嚴格遵守規定之用法用量。
  - (2)為避免重複服用之故，請勿與下列藥劑同時服用。  
其他鎮咳祛痰藥、鎮靜藥等。
  - (3)本劑如與感冒藥同時服用時，請與醫師或藥師商量。
- 3.服用中或服用後，請注意下列各點：
- (1)由於服用本劑而出現發疹、發赤、噁心、嘔吐、食慾不振、眩暈等症狀時，請停止服用，與醫師或藥師商量。
  - (2)服用本劑，有嗜睡之情形，請勿駕駛車輛或操作機械。
  - (3)如服用數次而症狀仍未見改善，請停止服用，與醫師或藥師商量。
- 4.管理上之注意點：
- (1)請保存於兒童不易取得處。
  - (2)請保存於陰涼及較乾燥處所。
  - (3)請勿變換容器，俾免誤服，兼可保持品質。

……包 裝……

15 粒、100 粒、200 粒、500 粒及 1000 粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝

®：註冊商標（日本 塩野義製藥株式会社授權使用）

---

## 台灣塩野義製藥股份有限公司

公司地址：台北市南京東路二段2號4樓

電話：(02) 2551-6336（代表號）

工廠地址：基隆市七堵區工建西路5號

電話：(02) 2451-2466（代表號）