

"信東" 硫酸鎂 注射液

Magnesium Sulfate Injection "TBC"

【成分】

每mL中含有：

Magnesium sulfate · 7H₂O.....100mg

相當於每一安瓿（20mL）16.23mEq

【適應症】

子癇症、子癇前症、妊娠毒血症、產科全身麻醉輔助；體內鎂離子缺乏時之補充。

【用法·用量】

本藥限由醫師使用。

子癇症、子癇前症、妊娠毒血症、產科全身麻醉輔助：

通常每日量1~10g I.V.或I.M.，子癇症時頭一次投予4g，後每半小時靜脈注射5mL（0.5g）。

體內鎂離子缺乏時之補充：

本藥每mL含Mg²⁺：0.81mEq，僅限用於全靜脈營養輸注液調配使用。請勿直接單獨做末梢靜脈內點滴注射。

【注意事項】

1. 有腎功能障害之患者；高鎂血症患者；腸內有寄生蟲之小孩患者及有心臟疾病患者必須審慎投與，以免造成危險。
2. 妊娠婦投與時，由於硫酸鎂很容易通過胎盤，曾經有引起極少數新生兒之高鎂血症，故應小心投與。
3. 本藥與含有磺胺劑、鹼性碳酸鹽、碳酸氫鹽、酒石酸鹽、可溶性磷酸鹽、砷酸鹽、溴化鉀、溴化銨等製劑一起混合使用時會有沉澱產生，配合時必須注意。
4. 本藥若用於體內鎂離子缺乏時之補充因而做全靜脈營養輸注液調配使用時，請勿單獨做末梢靜脈內點滴注射。
5. 本藥若與其他全靜脈營養輸注液調配混合後，請儘速使用。
6. 硫酸鎂中毒時常引起呼吸停止，應隨時注意血中濃度並給予鈣劑注射解毒。

【副作用】

高劑量時會引起鎂離子中毒、熱感、血壓下降、抑制中樞神經，以及呼吸麻痺等現象，解毒方式，可以鈣離子製劑（如葡萄糖酸鈣注射液）以靜脈注射補充。

【玻璃瓶裝使用之注意事項】

（一）取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色，異物或其他異常現象時，請勿使用。

（二）輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割（Coring）產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【保存條件】

室溫25℃以下貯存。

【包裝】

20毫升玻璃安瓿、塑膠安瓿裝、200毫升玻璃瓶裝。

衛署藥製字第004771號



信東生技股份有限公司
桃園市介壽路22號

IM038③