

“優良”優可黴素膠囊 250公絲 (西華克樂)
500公絲

U-CLOR CAPSULES 250 MG
500 MG (CEFACTOR)

“優良”優可黴素膠囊 U-Clor Capsules 的主成份 Cefaclor 是一種口服半合成 Cephalosporin 類抗生素。化學式為 3-Chloro-7-D- (2-phenylglycinamido) -3-cephem-4-carboxylic Acid。

藥 理：

“優良”優可黴素在空腹狀態下，口服吸收良好，不論飯前或飯後服用，其總吸收量都相同。空腹時，服用 250mg, 500mg, 1Gm 的劑量，30~60分鐘內可測得平均最高血中濃度，分別為 7, 13 或 23 ug/ml，八小時內，有 60~85% 的藥物從尿中以原形式排出。但大部份是在頭二小時內排出的，其最高尿中濃度各為 600, 900, 1900 ug/ml。正常情形之下，在血中半衰期為 0.6~0.9 小時，但對於腎功能不健全的患者，其半衰期稍長些。至於那些腎功能完全喪失的患者，半衰期則長達 2.3~2.8 小時。

成 份：

每膠囊內含 Cefaclor (as Monohydrate) 250 mg 及 500 mg (力價)。

作 用：

實驗顯示，Cephalosporin 類抗生素的抗菌作用在於抑制細菌細胞壁的合成。實驗和臨床上，“優良”優可黴素膠囊對以下各種感受性細菌所引起的中耳炎，上呼吸道，下呼吸道，泌尿生殖道，以及皮膚和軟組織的感染有很好的療效：葡萄球菌 (Staphylococci)，包括凝固酶陽性 (Coagulase-positive) 凝固酶陰性 (Coagulase-negative) 化膿性鏈球菌 (Streptococcus pyogenes)，乙種溶血性鏈球菌 A 族 (Group A beta-Hemolytic Streptococcus) 肺炎鏈球菌 (Streptococcus pneumoniae)

大腸桿菌 (E. Coli)

奇異變形菌 (Proteus mirabilis)

克雷白氏菌屬 (Klebsiella species)

流行性感嗜血桿菌 (Haemophilis influenzae)，包括對 Ampicillin 有抗藥性的菌株。

適 應 症：

葡萄球菌，甲、乙種溶血性鏈球菌，肺炎雙球菌，大腸桿菌，奇異變形菌，克雷白氏菌屬，嗜血桿菌等病原菌所引起的感染症。

用法用量：

成人——一般劑量為每八小時 250mg，嚴重感染，劑量可加倍，但每日最高劑量以 4Gm 為限。

兒童——建議劑量為每日每公斤體重 20mg，分三次服用。嚴重感染劑量可加倍，但每日最多以 1Gm 為限。

感染乙種溶血性鏈球菌的患者，服用本劑，至少要連續服用十天。

本藥須由醫師處方使用。

禁忌：

已知對 Cephalosporin 類抗生素過敏的患者，對本劑也會有過敏反應。

警語：

對青黴素過敏的患者，使用本劑須特別小心。因臨床和實驗顯示，青黴素和頭芽孢菌屬抗生素可能有部份交互過敏反應現象。

副作用：

1. 腸胃道：偶會有噁心、嘔吐、腹瀉現象。與其它廣效性抗生素合用，會有罕見的假膜性結腸炎發生。
2. 過敏：有些患者會有藥疹，搔癢，陽性 Coombs test，多形紅斑，關節痛，發燒等反應，而這些反應在停藥後會漸漸消失。對青黴素過敏的患者，對本劑亦會有過敏反應。
3. 偶會有嗜伊紅血球增多，生殖器搔癢，陰道炎等現象發生。會有 SGOT, SGPT 稍稍提高的情形。

注意事項：

1. 服用本劑，若有過敏反應，則須停藥，若有必要可以加壓胺，抗組織胺，腎上腺皮質素處理。
2. 長期服用本劑，可能引起體內非感受性細菌的過度生長，服用期間要詳加觀察。
3. 治療期間，若發生再感染，則須採取適當措施。
4. 分娩前服用 Cephalosporin 類抗生素的患者，其新生兒在 Coombs test 中呈陽性反應。
5. 腎功能不健全的患者，必須慎用本劑，其服用劑量通常較低些。
6. 服用本劑，尿糖可能有假陽性反應。
7. 孕婦及新生兒使用本劑的安全性尚未確定。

包裝：

10'S, 50'S, 100'S, 500'S, 1,000'S 膠囊瓶裝，鋁箔盒裝。

"U-Liang" C017 "優良" 優可黴素膠囊250公絲 衛署藥製字第27513號

"U-Liang" C018 "優良" 優可黴素膠囊500公絲 衛署藥製字第27514號

優良化學製藥股份有限公司

台灣省桃園縣中壢市東園路十七號