

綜合電解質注射液

“大塚” 台大注射液

本藥限由醫師使用

“大塚”台大1號注射液 衛署藥製字第021632號 “大塚”台大3號注射液 衛署藥製字第021629號
“大塚”台大2號注射液 衛署藥製字第021630號 “大塚”台大4號注射液 衛署藥製字第024258號

台大1,2,3,4號注射液，係根據台大醫學院附設醫院小兒科之處方所製成之產品，為綜合電解質及基礎營養補充液，可使下痢症之治療更安全、方便和有效。

各注射液之差異，主要在於Na之濃度。其組成如下。因其含有醋酸鈉、醋酸鉀、磷酸鈉及氯等，故不需另外添加就可立即使用。

〔組成〕：W/V%

成份 品名	NaCl	CH ₃ COOK	CH ₃ COONa	MgCl ₂ ·6H ₂ O	KH ₂ PO ₄	NaH ₂ PO ₄ ·H ₂ O	Glucose (C ₆ H ₁₂ O ₆)
台大1號	0.097	0.118	0.066	0.030	0.082	-	3.8
台大2號	0.152	0.118	0.066	-	-	0.083	3.3
台大3號	0.357	0.118	0.066	-	-	0.083	2.0
台大4號	0.596	0.079	0.066	-	0.164	-	0.8

〔電解質量〕：

品名	電解質 mEq/L						Glucose g/L	Osmolality mOsm/L	pH
	Na	K	Mg	Cl	Acetate	Phosphate m mole/L			
台大1號	25	18	3	20	20	6	38	300	4.0~7.5
台大2號	40	12	-	26	20	6	33	287	4.0~7.5
台大3號	75	12	-	61	20	6	20	285	4.0~7.5
台大4號	110	20	-	102	16	12	8	300	4.0~7.5

〔適應症〕：

台大1號：水份、電解質、養份補充、新生兒維持液。

台大2號：高張性下痢及小兒下痢之水份、電解質、養份補充。

台大3號：水份、電解質、養份補充、維持液，等張性下痢及真性糖尿病引起之酮病的治療。

台大4號：低張性下痢時之水份、電解質、養份之補充。

〔用法·用量〕：

通常一回500mL，靜脈內點滴注射，得依年齡症狀做適宜之增減。

〔注意事項〕：

(1)取用時：

- ①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ②本品為無色~淡黃色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法：

- ①請依輸液套使用方法正確使用。
- ②請使用附有過濾裝置之輸液套，導針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- ③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

〔包裝〕：

250、500mL塑膠瓶裝。

〔有效期限〕：

請見外箱或標籤上之標示。



台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠
桃園縣中壢市吉林路15號

EP15-1809