

痔克妥栓劑

Faktu® Suppositories

(衛署藥輸字第016450號)

[組成]

栓劑：每個栓劑POLICRESULEN 100MG和CINCHOCAINE HYDRO.
CHLORIDE 2.5MG.

[適應症]

痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。

[禁忌]

*對CINCHOCAINE過敏者不可使用。

*懷孕期必須估算出對母體及胎兒的全部可能危險。在絕對需要時才可使用。

*動物試驗沒有發現任何畸胎形成使用於懷孕婦女所可能的危險研究報告尚未提出，仍未知道主成份是否會存在哺乳母親的乳汁中。

[副作用]

在開始治療時偶有極輕微的局部不適，如：癢、燒灼感。但通常能迅速消退，不須停藥。

[用法、用量]

栓劑：本藥須由醫師處方使用。

每天2-3次，每次一個，於排便後塞入。症狀消除後，可改為每天一個栓劑。

[注意]

貯存於25°C以下。

注意包裝上的有效期限。

栓劑可能會變色以及包裝可能會破損，但不會影響產品有效性。

貯存時必須需小心，勿讓兒童觸及。

[包裝]

栓劑：10粒一盒裝。

製造廠：Nycomed GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
D-78224 Singen
Germany

藥商：瑞慶藥業有限公司
台北市中正路210-2號1樓
TEL: (02) 25790001 • 25773877
FAX: (02) 25791634