

# “濟生” 乳酸化林格氏 注射液

LACTATE RINGER'S INJECTION

"CHI SHENG"

本藥為無色或微黃色之透明澄清液體。

成 分 每100ml中含有：

Calcium Chloride( $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )..... 20 mg  
Potassium Chloride..... 30 mg  
Sodium Chloride .....600 mg  
Sodium Lactate ..... 310 mg  
Water for Injection add to make ..... 100 ml  
電解質組成：  
 $\text{Na}^+$  130mEq/L,  $\text{K}^+$  4mEq/L,  $\text{Ca}^{++}$  3mEq/L,  
 $\text{Cl}^-$  109mEq/L, Lactate 28mEq/L.  
滲透壓比：約1

適應症 酸中毒、霍亂、痢疾、傷寒、自家中毒等重症之腹瀉時的水份補給，心臟衰弱，尿毒症必要時之電解質及水份之補給。

用法用量 一般用量為20，50，100，300，500，1000ml視症狀需要作靜脈或皮下注射，作靜脈注射時宜徐緩行之。  
本藥限由醫師使用。

注意事項 (一)取用時：

- (1)運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
- (2)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

- (1)請依輸液套使用方法正確使用。
- (2)請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- (3)使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包 裝 安 瓶 裝：20ml, 50ml×50Amps.  
玻璃瓶裝：500ml×20Bots.  
塑膠瓶裝：500ml×30Bots.  
1000ml×20Bots.

內 衛 藥 製 字 第 04899 號



CHI SHENG

濟 生 化 學 製 藥 廠 股 份 有 限 公 司

CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION

編 號  
3271

新 竹 縣 湖 口 鄉 新 竹 工 業 區 實 踐 路 3 號

電 話：(03)5 9 8 3 8 1 1 (代 表)