

“優生” 碳酸鈣 錠500公絲

Calcium Carbonate Tablets 500mg "Y.S."

衛署藥製字第033686號

LT-116-CL

【主要成份】：每錠含

Calcium Carbonate.....500mg

【適應症】：

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法用量】：

一天3次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。

成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；

6歲以上未滿12歲，每次1錠；

3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

單次劑量(2錠)之酸中和能力為9.0mEq以上。

【類別】：

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：

- 一. 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】：

- 一. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (一) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
 - (二) 未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (三) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (四) 本藥不得併用其他藥品。
- 二. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四. 本藥含鈣之制酸成分，可能引起便秘或腹瀉；長期服用可能有高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 五. 本藥含碳酸鹽之制酸成份，可能引起腹脹、打嗝。

【儲藏】：請儲藏於25°C之下，避免陽光直接照射。

【包裝】：6-1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



優生製藥廠股份有限公司

台中市工業區工業21路14號

MM 200606