



抗生素製劑

ZFC-004
衛署藥製字第029079號
Code No.:32049

奇福黴素

(力克沙西林)

膠囊 250公絲

Ziefmycin

Capsules 250mg

(Dicloxacillin)

Dicloxacillin屬於isoxazolyl penicillin，其具抗酸性，不受胃酸之破壞，故可以口服，使用上方便；而且不受penicillinase的分解，口服後吸收情形良好，其血中濃度比其他種口服penicillin都要來得高；抗菌譜遍及所有G(+)菌，為殺菌性之抗生素，不易產生抗藥性菌，無肝腎障礙性，低劑量即有高效率，毒性小，安全性佳，故廣受採用。

【成分】每膠囊中含：
Dicloxacillin (as Sodium) 250mg (potency)

- 【特徵】
1. 本藥作用於細菌細胞壁，抑制其合成而有殺菌性作用；並可抑制細菌細胞之分裂及其生長，使感受性菌溶化而徹底撲滅細菌。
 2. 本藥不似其他的制菌性抗生素，在治療期間不易產生抗藥性，而使療效迅速，縮短治療期間，故可根本地治療感染性疾病而不易復發。
 3. 本藥的抗菌譜遍及所有容易引起感染症的革蘭氏陽性菌，包括會產生penicillinase的鏈球菌，肺炎雙球菌，對penicillin G有感受性的以及有耐藥性的葡萄球菌等臨床上棘手的病原菌，故使用本藥時可以不必考慮細菌的耐藥性問題。
 4. 本藥對於與日俱增的Penicillin G抗藥性之葡萄球菌為首選之藥物，故對於疑似penicillin G抗藥性之葡萄球菌所引起之感染症時，不待培養結果與敏感性試驗有結果之前便可優先使用本藥以爭取時效。
 5. 本藥毒性小、安全性高，殆無一般抗生素常易引起的肝、腎障礙，和不破壞造血機能，有上列情形之患者亦可安心使用，此點尤適於有重度感染症而須使用高劑量之抗生素的情形。
 6. 本藥為抗酸性，可口服的penicillin，其經由胃腸道之吸收情形甚佳，比penicillin G或penicillin V更少的劑量投與，卻可獲得更高的有效血中濃度。
 7. 較諸其他抗生素，本藥之用量較少而藥效卻較高，堪稱經濟而又可靠的藥物。

【適應症】
葡萄球菌、β-溶血性鏈球菌和肺炎雙球菌等細菌所引起的感染症。

【用法·用量】
輕度至中度感染症—40公斤以上之兒童及成人每次125mg（力價）每6小時服用一次；40公斤以下之兒童則依12.5mg/kg/day，分四次，仍以每6小時服用一次。
重度感染症—40公斤以上之兒童及成人每次250mg（力價），每6小時服用一次，40公斤以下之兒童依25mg/kg/day分四次，每6小時服用一次。最好是空腹時或飯前1~2小時服用。
本藥須由醫師處方使用。

- 【注意事項】
1. 曾經對penicillin類cephalosporin類或其他allergea產生過敏反應者應慎重使用本藥。
 2. 一旦發生過敏反應則應馬上停藥，並採取epinephrine, corticosteroids, antihistamines作適宜的處置。
 3. 長期使用本藥可能導致非敏感性菌過度增殖，故有重複感染時應停用本藥，並採取適當的措施。
 4. 本藥對於孕婦之安全性尚未確立。
 5. 本藥可能會發生下列之副作用，停藥後即可消失：
 - ① 胃腸道方面：噁心、嘔吐、上腹部不適、胃腸脹氣、軟便。
 - ② 過敏性：搔癢、蕁麻疹、皮膚疹。
 - ③ 嗜伊紅性血球增多症、SGOT值稍有昇高。

- 【保存上之注意】
1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
 2. 室溫（15~30°C）、避光儲存。
 3. 請在有效期限內使用。

【包裝】
4~1000粒玻璃瓶裝、罐裝及盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04)26875100

台中幼獅三廠：台中市大甲區日南里工六路26號

2150522