



外用抗黴菌劑

AVO-003 外用
衛署藥製字第020296號

分消

無黴

乳膏

Winsolve Antifungal Cream

癬，通常是由黴菌所引起之表淺性皮膚感染。由於黴菌極易生存在潮溼的環境中，因此好發於天熱多汗時節；又台灣地處亞熱帶地區，天氣濕熱，因而使得各種類型的癬症頗為普遍。癬依生長部位而有不同的命名，其致病菌也有許多種，其中以髮黴菌、表皮黴菌及小芽胞菌最為重要也最為常見。分消無黴乳膏含有具殺黴菌作用之主成分—Miconazole，效果涵蓋各種常見之癬症，如：足癬（香港腳）、股癬、圓癬等。

分消無黴乳膏不含類固醇，為治療頑固癬症所不可或缺。

[成 分] 每公克中含：
Miconazole Nitrate..... 20mg

[作 用]

- 本藥具有殺黴菌之效果。
- 本藥含廣效之抗黴菌活性成分，能殺滅黴菌致病菌，是治療股癬、圓癬、足癬及汗斑的最佳選擇。

[適 應 症] 治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑。

[用 法 用 量] 取適量塗抹於患處，每日2次。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

[警 語] 對本藥成分過敏者不得使用。

[注 意 事 項]

- 須置於小孩接觸不到之處。
- 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本藥勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用本藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 塗抹本藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 黴菌治療至少需要二星期，使用此藥須完成全程療程。
- 一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善則應停藥立即就醫。即使症狀有改善，停藥後若病情復發仍應立即就醫。

[副 作 用] 本藥耐受性良好，針對部分患者偶有局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎、紅、腫、水泡、脫皮及搔癢等現象。

[保 存 上 之 注意]

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 室溫(15~30°C)、避光儲存。
- 請在有效期限內使用。

[給皮膚癬患者的治療建議]

- 保持患部乾爽，避免過度流汗或運動。
- 避免穿著過度緊身之衣物。
- 少吃辛辣或刺激性食物。
- 禁止搔抓患處，必要時可將患處包紮或施行冰敷止癢。
- 按時正確的使用外用藥膏。

[包 裝] 3~1000公克鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

★如果您對本產品在使用上有任何疑問，請逕洽居家用藥諮詢專線0800-012-679，本公司專業藥師將竭誠為您服務。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140187