

「生達」<sup>®</sup> 乳膏 5% (艾賽可威)

# 疱寧<sup>®</sup>

乳膏 5%  
(艾賽可威)

# DEHERP<sup>®</sup>

Cream 5%  
(Acyclovir)

"Standard"

「生達」<sup>®</sup> 疱寧乳膏是本公司經過不斷研究開發所產生的心血結晶，其主成份Acyclovir能選擇性作用在受病毒感染的細胞上，經由病毒所特有的Thymidine kinase將Acyclovir磷酸化成Acyclovir monophosphate，再進一步轉變形成Acyclovir diphosphate及Acyclovir triphosphate，然後干擾單純疱疹病毒的DNA聚合酶，進一步產生抑制病毒DNA複製的作用，本品對於單純疱疹病毒的感染具有理想的療效，誠為治療疱疹患者的最佳選擇用藥。

【主 成 分】：每公克含：

Acyclovir.....50mg

【作用特點】：1.本品具有高度選擇性，對於未受病毒感染之正常細胞並無影響。

2.本品毒性相當低，誠為治療病毒性感染的最佳選擇用藥。

3.由生體外試驗，顯示本品對於單純疱疹病毒I型、II型及水痘帶狀病毒均有相當高的抑制活性。

4.本品可抑制病毒在寄主細胞中的複製，而加速治癒作用及快速緩解疼痛。

【適應症】：單純疱疹病毒引起之皮膚感染。

【用法用量】：1.本藥須由醫師處方使用。

2.取適量塗敷於患部，通常每4小時塗一次，一天5次，連續使用5天。如未痊癒，則可連續使用10天。

30102

生達<sup>®</sup> 艾賽可威乳膏  
香港九龍彌敦道100號  
德華製藥有限公司



- [注意事項]:
- 1.本品僅供皮膚外用，勿使用於眼睛及黏膜。
  - 2.對本品過敏之患者，禁用。
  - 3.使用本品之劑量、次數及治療時間請勿超過推薦之用法用量。
  - 4.本品與其他局部或全身性作用之藥物併用，未知有交互作用產生。
  - 5.無充分資料指出使用本品對孕婦及胎兒之影響，以及使用本品後乳汁中Acyclovir之濃度。因此孕婦及授乳婦女宜審慎評估利弊後再使用本品。

[副作用]: 使用本品後，可能發生短暫之灼熱感或刺痛，有小部分之病人曾有紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落之報告。

[包裝]: 1000公克以下塑膠瓶、鋁管裝。  
儲存於25℃以下之乾燥處。

衛署藥製字第038288號 G-4540 LT-OD04 3216250  
中華民國專利證號發明084682號

Acyclovir  
20mg  
[成分主]: 本品含有高純度之Acyclovir，其純度符合藥典規定。  
[包裝]: 本品以鋁管裝，每管含Acyclovir 1000公克。  
[用法]: 每日塗抹患處，每日塗抹次數依醫師指示。  
[適應症]: 本品適用於單純疱疹病毒及水痘-帶狀疱疹病毒之皮膚感染。  
[禁忌]: 對本品或本品中任何成分過敏者禁用。  
[副作用]: 使用本品後，可能發生短暫之灼熱感或刺痛，有小部分之病人曾有紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落之報告。  
[注意事項]: 1.本品僅供皮膚外用，勿使用於眼睛及黏膜。2.對本品過敏之患者，禁用。3.使用本品之劑量、次數及治療時間請勿超過推薦之用法用量。4.本品與其他局部或全身性作用之藥物併用，未知有交互作用產生。5.無充分資料指出使用本品對孕婦及胎兒之影響，以及使用本品後乳汁中Acyclovir之濃度。因此孕婦及授乳婦女宜審慎評估利弊後再使用本品。