

Perioxidin

Bioadhesive GEL

樂利口 抗炎凝膠

不含酒精

衛部藥輸字第 026152 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

主成分

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 2 毫克/克

功效

牙菌斑是造成牙周病的主要原因，不僅造成牙齦炎（牙齦腫脹、流血）甚至是牙周炎，其影響會擴及牙周韌帶及骨頭組織。

Chlorhexidine 可作為口腔內之殺菌、消毒之用。

適應症

口腔內之殺菌、消毒。

劑量及使用方法

可用手指或套管沾取適量本品直接塗抹於牙齦與牙齒交接處（齒齦溝），以指尖輕柔地按摩，本品會在牙齒和牙齦之間形成一道保護膜。建議一天使用本品兩到三次，每次 0.5-2 克（相當於 1-4 mg 之 chlorhexidine digluconate），並配合正確的衛生習慣。使用完本品後半小時內應避免進食及喝飲料。睡前使用效果最佳。使用後請勿漱口及請勿吞服。使用本品後，在進食前請先清潔口腔，以避免食入殘餘藥物。

副作用

當長期使用含 chlorhexidine 的產品，並接觸某些成分如茶、咖啡、酒和菸等，會造成牙齒表面變黃。顏色變化是表面的，藉由牙醫診所的潔牙技術即可輕易除去。長期持續使用可能產生暫時性的味覺改變。

注意事項

- (1) 僅限口腔衛生用途。
- (2) 請勿放置在兒童視線所及與伸手可拿之處。
- (3) 請勿吞食。
- (4) 請存放於乾燥通風處。
- (5) 曾有藥物過敏體質者，使用前請先請教藥師、藥劑生、醫師、牙醫師。
- (6) 使用時請遵守用法及用量。
- (7) 使用數日後如症狀未改善，請中止使用或請教藥師、藥劑生、醫師、牙醫師。

貯存條件

本品之架儲期為 4 年（儲存溫度為 25°C 以下）。

包裝

1000 公克以下鋁管裝。

製造廠：LACER, S.A.

廠址：C/Boters, 5, Parc Tecnològic del Vallès, 08290
Cerdanyola del Vallès- Barcelona, Spain

藥商：元聖企業股份有限公司

地址：台北市民權西路 27 號 5 樓之 1