

吉多利錠

Ketosteril Tablets

衛署藥輸字第018273號
本藥限由醫師使用

[成份] 每一錠含

| | |
|--|--------------------------|
| Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate | |
| (α -Ketoanalogue to isoleucine, Calcium salt) | 67 mg |
| Calcium-4-methyl-2-oxo-valerate | |
| (α -Ketoanalogue to Leucine, Calcium salt) | 101 mg |
| Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate | |
| (α -Ketoanalogue to Phenylalanine, Calcium salt) | 68 mg |
| Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate | |
| (α -Ketoanalogue to Valine, Calcium salt) | 86 mg |
| Calcium-DL-2-hydroxy-4-(methyl-thio)-butyrate | |
| (α -Hydroxyanalogue to Methionine, Calcium salt) | 59 mg |
| L-Lysine-acetate (Δ 75 mg L-Lysine) | 105 mg |
| L-Threonine | 53 mg |
| L-Tryptophan | 23 mg |
| L-Histidine | 38 mg |
| L-Tyrosine | 30 mg |
| Total nitrogen content/tablet | 36 mg |
| Calcium/tablet | 1.25 mmol Δ 0.05g |

[適應症]

慢性腎不全時胺基酸之補給。

[禁忌症]

高血鈣症、胺基酸代謝紊亂。到目前為止尚無應用於孕婦及幼兒之報告。

[副作用]

偶有高血鈣症。應定期檢查血清鈣含量。應確定給予病患足夠的卡路里。

[相互作用]

含鈣藥品 (例如：acetolyte) 可能引起血清鈣含量病理性的增加。

由於Ketosteril使尿毒症狀減輕，若有服用氫氧化鋁應減量。注意血清磷酸鹽的減少。為了避免干擾吸收，勿同時投與易和鈣形成複合物的藥物 (例如：tetracycline)。

[用法用量]

口服。遵照醫師處方使用。或70公斤之成人，一次4到8錠，一天三次。餐中服用。

[使用時期]

腎絲球過濾率介於5-25 ml/min，且食物攝取含蛋白質 \leq 40g/day (成人)。

[注意事項]

超過有效期限請勿使用，請置於兒童不易取得處。

請同時配合醫師指示，限制每日蛋白質攝取量，以達到效果。

[包裝]

10-1500錠鋁箔片盒裝。



製造廠 : Labesfal, Laboratórios Almiro, S.A.

廠 址 : Zona Industrial do Lagedo, 3465-157 Santiago de Esteiro, Portugal

藥 商 : 台灣費森尤斯卡比股份有限公司

地 址 : 台北市大安區仁愛路三段32號5樓