

“衛達” 抑血凝 糖衣錠 10毫克

Acerine S.C. Tablets 10mg "Weidar"

GMP G-10839

CODE No. AC₁₀-0371



【成 分】：

每一糖衣錠含：

Nicergoline 10mg

賦形劑：HPMC, Sodium benzoate, Acacia powder, Sugar, Povidone K-30, Vanilla powder, Croscarmellose sodium, Dicalcium phosphate, Talc, Titanium dioxide, Starch potato dried, Gelatin, PEG 6000, Lactose 200, Potato starch pregelatinized, Sodium starch glycolate, Calcium stearate

【臨床藥理】：

迅速改善末梢血管循環障礙，具有α-Adrenolytic作用，可適當擴張血管，增加血流量，改善血管彈性。

【適應症】：

末梢血管循環障礙。

【用法用量】：

本藥須由醫師處方使用。

每次 5-10mg，一天 3 次在固定的間隔時段投與，為改善吸收，藥物應於餐間投與。

【注意事項】：

- 1.於急性出血或嚴重心跳徐緩或使用抗高血壓劑、抗凝血劑、血小板抑制劑之病人，應小心使用。
- 2.孕婦或可能懷孕之婦女最好不要使用。
- 3.避光貯存。

禁忌——

- 1.低血壓患者。
- 2.對本品過敏者。
- 3.頭部內出血。

【副作用】：

少有副作用報告。如：服用後低血壓，眩暈。輕微胃部失調，熱潮紅、嗜眠、失眠。

【貯 存】：於避光密閉容器內，25°C以下貯存。

【包 裝】：6~1000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 052428 號

衛達化學製藥股份有限公司

台中市工業區 23 路 21 號

製訂日期：104年9月11日