

“台裕” 膿化清 顆粒 (乙醯半胱胺酸)

Acetin Granules 66.67mg/Gm “Tai Yu”(Acetylcysteine)

“台裕”膿化清顆粒中所含之 Acetylcysteine，能破壞呼吸道中痰和其他含膿分泌物黏蛋白之聚合，並降低其黏度，故對黏液及黏液性、化膿性之分泌物有緩解作用。

【組成】

每公克含有：

Acetylcysteine..... 66.67mg(每 3 公克含 200mg)

【作用】

呼吸道黏液分泌物之黏度，主要決定於黏液蛋白之濃度及 DNA 之多寡。若因細胞破壞多，DNA 濃度增加，則黏液變成膿性黏液。Acetylcysteine 分子內 Sulfhydryl group 可將黏液中之 disulfide 鏈打開，因而降低其黏度，增加其溶解度及流動性，使易於排出。

【適應症】

減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。

【用法用量】

一天 3 次。成人每次 3gm，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1.5gm；3 歲以上未滿 6 歲，每次 0.75gm；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量。
5. 服藥後若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
6. 本藥不得與含酒精飲料併服。

【警語】

1. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - ① 3 歲以下，請洽醫師診治。
 - ② 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 本劑因會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如遇自然咳出困難時，宜採用機械吸引、拍痰或變換姿勢等適當的處理步驟。
5. 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列情況不建議自行使用：
 - ① (支氣管性) 氣喘及伴有呼吸功能不全之病人。
 - ② 高齡者。
6. 本藥含 Acetylcysteine，使用後若有以下症狀發生，應立即停藥就醫：
 - ① 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。
 - ② 偶有發疹等過敏症狀。
 - ③ 其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻漏、口內炎等症狀發生。

【賦形劑】

Dextrose anhydrous、Potato starch、Edetate disodium、Saccharin soluble、Sunset yellow FCF aluminum lake、Hydroxypropyl cellulose、Orange flavor powder、Isopropanol、Water purified。

【包裝】

1.5g/包、3gm/包鋁箔、6-333 包盒裝、18-1000 公克塑膠瓶裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 1 1 巷 1 3 弄 1 號
TEL：(03)5826655 FAX：(03)5822389
總經理：台灣美亞藥品股份有限公司
訂貨專線：(04)23265827~8 FAX：(04)23265829
地址：台中市西區精忠街 1 5 號