

衛署藥製字第 049558 號
G-10164 Code No. 31319

力克

眼用軟膏

Devirus

Ophthalmic Ointment

【作用】

Acyclovir 是一種抗病毒藥物，在體外試驗中，對單純性疱疹（HSV）第一、二型與水痘帶狀疱疹病毒非常有效。

Acyclovir 在進入被疱疹感染的細胞後，會磷酸化成活性化合物。這第一步驟的反應須依賴病毒生成的 thymidine kinase 酵素。

Acyclovir 三磷酸化合物會成為疱疹特异性 DNA polymerase 的抑制劑和受質，因此可以中止病毒 DNA 的合成，而不會干擾正常細胞的代謝作用。

眼藥膏中的 acyclovir 可經由角膜上皮及眼球表面組織很快地吸收，在眼前房水的濃度即可有效的抵抗病毒。本藥局部投與時，使用目前的方法無法偵測 acyclovir 在血液中的濃度，在尿液中的量可以偵測得出，但不具意義。

【成份】

Each gram contains :

Acyclovir.....30mg

賦形劑：Liquid Petrolatum、White Petrolatum。

【適應症】

單純疱疹性角膜炎。

【用法用量】

下列劑量適用於各種年紀的患者。

將軟膏擠出約1公分，塗於下結膜囊中，每天塗用5次，每次間隔約4小時，痊癒後，必須再繼續治療3天。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

已知對 acyclovir 過敏者，不可使用。

【注意事項】

使用本藥後可能會產生短暫性之輕微刺痛。

致突變性：在體內及體外所做廣泛之基因突變試驗結果指出 acyclovir 對人類沒有遺傳基因改變之危險。

生育力：對老鼠和狗投與超過治療劑量的大量 acyclovir 時，在毒性反應中包括會對精子生成有可逆性的不良作用。

經由兩代的老鼠研究中，發現口服投與 acyclovir 對生育力沒有任何不良作用。本藥對人類女性生育力的影響，尚無任何資料。

致癌性：對大鼠及小鼠的長期研究中，並沒發現 acyclovir 有致癌性。

【藥物交互作用】

Probenecid 會使 acyclovir 的平均半衰期和血漿濃度曲線下的面積增加。其他影響腎生理功能的藥物，有可能會改變 acyclovir 的藥品動力學。但是，臨床經驗並沒有發現其藥物會與 acyclovir 發生交互反應。

【副作用】

少部分的病人使用本藥品會產生短暫之輕微刺痛。曾有報告指出，使用本藥後發生表面斑點狀角膜病變，但曾報導使用本藥後有局部刺激及發炎現象，如：陰炎及結膜炎。

【懷孕、授乳】

對兔子或老鼠的投藥試驗中，並沒有發現胚胎毒性或畸胎性。

但在人體使用的臨床經驗仍屬有限，因此只有在衡量過可能的效果會大於未知的危險性時，才可使用本藥。目前有限的數據顯示本藥會由乳汁分泌出來。

【過量】

有人誤食整條含有 135mg acyclovir 的軟膏，沒發現有不良反應。

口服每次 800mg，一天 5 次（即每天 4 公克），連續 5 天，也沒有副作用報告。甚至不小心靜脈注射 80mg/kg 的高劑量，並無不良反應發生，acyclovir 可被透析。

【藥物注意事項】

經打開一個月後之本藥必須丟棄。

【包裝貯存】

100 公克以下鋁管裝、積層管裝、塑膠管裝。本藥應貯存於 25°C 以下。

1710-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號