



000602

景安寧 錠

0.5 毫克，1 毫克（三氮二氮平）

KINAX Tablets
0.5mg · 1mg (Alprazolam)

【主成分名（中文名）】

Alprazolam（三氮二氮平）

【劑型、含量】

錠劑：每錠含 Alprazolam (0.5mg, 1mg)

【特性】

本品係 1,4 benzodiazepine 之 triazolo 類似物，係影響中樞神經系統之化合物；為白色結晶粉末，可溶於甲醇或乙醇，但在生理食鹽水中溶解度不佳。

【作用】

1. 本品口服投與後，吸收迅速，一、二小時後血中濃度達到最巔峰，血中濃度與投與量成正比例，其代謝半衰期平均是 12-15 小時。
2. 本品代謝物為 α -hydroxy-alprazolam 以及 alprazolam 之 benzophenone 衍生物，前者活性約為 Alprazolam 的一半，而後者 (benzophenone) 則殆無活性，但是由於血中濃度極低，故無須計較其藥力學。另外，本品及其代謝物主要由尿液排泄。
3. Alprazolam 之誘導人體肝酵素系統的能力尚未成定論，但是大部份 benzodiazepines 不具這類性質。
4. 本品在試管中，約 80% 與人體血清蛋白結合。
5. 酒精中毒、肝機能或腎機能不良者據說會改變 benzodiazepines 之吸收、代謝、分佈和排泄，同樣也會改變老年病患對此藥之代謝，但尚不確定對 alprazolam 也會產生相同的藥力學變化。

【適應症】

焦慮狀態。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

1. 通常初劑量 0.25-0.5mg，一日三次，可視病人需要逐漸增加到每日最大量 4mg，分幾次投藥。
2. 老年或體衰之病人，通常初劑量是 0.25mg，一日二~三次，可視需要和耐受性而逐漸增大劑量。
3. 如果初劑量讓病人產生副作用，則應減低劑量。在治療終止或降低日用量時應逐漸遞減，一般建議劑量之遞減每三天應不超過 1mg。
4. 用於兒童：對 18 歲以下兒童之安全性和有效性尚未建立。

【交互作用】

Benzodiazepines 類藥物當併用其他影響神智、抗痙攣或組織胺，乙醇等抑制 CNS 的製劑，會加成抑制 CNS 的效果。

【禁忌】

1. 對 Benzodiazepines 過敏的病人，禁用 Alprazolam。
2. 本品可使用於正接受適當療法之廣角性青光眼患者，但對狹角性青光眼是禁用。

【警語與注意事項】

1. Alprazolam 不能用來治療精神病患，也不能替代適當之精神病療法。
2. 凡在從事危險性職業需高度警覺之病人，譬如操作機械或駕車者，勿使用本品治療。
3. 接受本品治療之患者，針對酒精及其他 CNS 抑制劑應保持謹慎。
4. 本品屬於 Benzodiazepines 之一種，故推測也能透過胎盤，對胎兒造成危險性，並會出現在母乳中；所以妊娠前三個月避免使用此藥，婦女在接受治療前應先考慮這段期間是否有懷孕的可能；醫師也應囑咐病人在治療期間懷孕或準備懷孕，應當先行提出以便停藥。
5. 服用本品一段時間（例如一週至四個月），如突然停藥或迅速減量會有禁斷症狀產生。
6. 併用 opioid 類藥品：Benzodiazepine 類藥品與 opioid 類藥品併用，可能導致重度鎮靜 (profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

【副作用】

本品副作用常出現在治療時，而通常在續用藥後，作用即消失。
一般常見的副作用有思睡、頭昏眼花、抑鬱、噁心、眩暈、嘔吐、口乾等現象。

【賦形劑】

0.5mg：Lactose、Sodium Starch Glycolate、Avicel、Corn Starch、Magnesium Stearate、New Coccine。
1mg：Lactose、Cellulose Crystalline、Sodium Starch Glycolate、Corn Starch、Magnesium Stearate。

【貯存】

請置於密封容器中、於 30°C 以下 (59-86°F) 下貯存之。

【包裝】

6-1000 粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

0.5mg：衛署藥製字第 042686 號
1mg：衛署藥製字第 041465 號



synmosa

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號
製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠
製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號

SLT0006C