



止癢/不含類固醇

強力施美藥膏

C.B.Ointment“Strong”

作用:

- Chlorpheniramine maleate:具止癢作用。
- Lidocaine HCl:含有可暫時緩解因皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢症狀之成分。
- Methyl Salicylate、Menthol、Camphor等具有鎮痛、止癢、及清涼等作用。

有效成分及含量: 每公克含有

有效成分	含量
Chlorpheniramine maleate	10mg
Lidocaine HCl	30mg
Methyl Salicylate	10mg
dl-Menthol	10mg
dl-Camphor	5mg

其他成分(賦形劑): Stearyl alcohol, Cetyl alcohol, Glycerol monostearate, Liquid petrolatum , Tween 60, Span 60, Propylene glycol, Hexachlorophene, Water purified

用途(適應症):

暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

使用上注意事項:

一、有下列情形者,請勿使用:

- (一)曾因本藥成分引起過敏。
- (二)曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏反應者。

二、有下列情形者,使用前請洽醫師診治:

- (一)3歲以下。
- (二)有深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

- (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二)要使用於臉部。
- (三)2歲以下兒童。

四、其他使用上注意事項

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量或使用次數。
- (四)使用部位或其周圍髒污時,請洗乾淨後再用藥。

(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

(六)本藥限於外用不得內服,亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛,請立刻以水或溫水沖洗,並立即前往眼科就醫。

(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(九)使用後請保持塗抹部位透氣,勿密封,以免增加副作用。

(十)請勿使用在面部以外,也勿當作預防使用。

(十一)本藥不可連續使用超過7天。

(十二)不得大量使用,以避免全身性吸收,曾有致死報告。

(十三)避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。

(十四)不可長期大面積使用,以免引起水楊酸中毒症狀,如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛,使用前請諮詢醫師或藥師。

用法用量:

需要時使用

適量塗抹/塗擦於患部

警語:

一、使用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	副作用
皮膚	局部灼熱、刺痛、過敏性反應、紅斑、搔癢、刺痛感。
其他	水楊酸效應(耳鳴、暈眩噁心嘔吐等)

二、使用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:

- (一)若有上述外之其他不適情況產生。
- (二)使用7天後,自覺狀況沒有改善或更惡化。

包裝: 1,000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

儲存條件: 於室溫(15-30°C以下)保存,並置於孩童無法觸及之處。

製造廠
中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新豐工廠：新竹縣新豐鄉杭子口 182-1 號②
http://www.cccpg.com.tw

總經銷
中化裕民健康事業股份有限公司
ChungHwa Yuning Healthcare Co., Ltd.
總公司：台北市中正區襄陽路23號8樓

