

碳酸鈣錠 500 毫克

Calcium Carbonate Tablets 500mg “Yihhaw”

【成分】

有效成分及含量：每錠含有

Calcium Carbonate.....500mg(毫克)

其他成分(賦形劑)：

白色錠：

Starch、Sodium Starch Glycolate、Mannitol、Microcrystalline Cellulose、Saccharin Sodium、Povidone K30、Orange Flavour Powder、Magnesium Stearate、Lactose Monohydrate、Purified Water

黃色錠：

Starch、Sodium Starch Glycolate、Mannitol、Microcrystalline Cellulose、Saccharin Sodium、Povidone K30、Orange Flavour Powder、Magnesium Stearate、Lactose Monohydrate、Purified Water、Tartrazine

【用途(適應症)】 緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治

(一) 3歲以下。

(二) 消化道潰瘍的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量，單次劑量(1錠)之酸中和能力為9mEq。

(四) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(五) 劑錠劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年齡	使用量
成人及 12 歲以上	一天 3 至 4 次，每次一錠或需要時服用，應嚼咬後吞服
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人使用量之 1/2
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人使用量之 1/4
3 歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

本藥是一種口服碳酸鹽結合劑，可以取代含鋁制酸劑，尿毒症患者服用後可避免鋁中毒之副作用，亦可降低血中的磷，以避免副甲狀腺功能亢進。

【包裝】 6-1000 錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【儲存】 請放置於兒童取用不到的地方，25°C 以下，避光儲存。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢電話】 02-27648055

衛署藥製字第 034537 號

製造廠：利達製藥股份有限公司

廠址：台中市大甲區中山路一段 906 號

電話：04-26872345

委託者：鎡浩貿易股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路五段 222 號 4 樓

電話：02-27648055

