



"濟生"新斯狄格明注射液

NEOSTIGMINE INJECTION "CHI SHENG"

內衛藥製字 第 000337 號

限由醫師使用

版本日期 2024-01-12

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each mL contains:

Neostigmine Methylsulfate.....0.5 mg

1.2 賦形劑

Sodium Acetate 3H₂O、Sodium Bisulfite、Sodium Chloride、Water for injection

1.3 劑型

注射劑

1.4 藥品外觀

無色澄明液

2 適應症

1. 各種腸管麻痺及排尿困難。
2. 由於肌無力、肌肉麻痺、腦溢血、小兒麻痺、神經痛、關節痛等引起之各種運動障礙。
3. 眼肌無力症、綠內障、瞳孔反應檢查。

3 用法及用量

3.1 用法用量

成人通常每日一次，一次1mL注射於肌肉內，依年齡及症狀之輕重由少量而漸次增量至一次3mL或一日數次，一次1mL可反覆使用，腸麻痺者一次1mL亦可每隔4~5小時反覆使用，對於眼科領域一次0.5~1mL注射於皮下內。

本藥限由醫師使用。

4 禁忌

目前尚無資訊。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 妊娠期/生育期

妊娠期—Neostigmine未在人體或動物作這方面的研究，使用時宜謹慎評估之。

分娩—抗膽鹼製劑，可能會導致尿道刺激及靜脈注射時，可能導致早產。

6 特殊族群注意事項

未有這方面使用產生問題的文獻；宜謹慎使用。

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

Neostigmine比Ambenonium或Pyridostigmine易產生嚴重的蕁毒素(Muscarinic)的副作用。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Neostigmine有抗Cholinesterase作用，在身體內能防止Acetylcholine之分解，而增加Choline作用(即副交感神經興奮作用)，其主要之作用，乃刺激腸管之蠕動及興奮膀胱肌之張力。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1毫升玻璃安瓿，100支以下盒裝。

13.2 效期

如外包装標示。

13.3 儲存條件

本藥應避光儲存於25°C以下。

製造廠

濟生醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號

藥商

113.01.12

濟生醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號

